## Behandlungsplan Clomhexal ® (Clomifen) und Pregnyl ® (HCG),

- Im ersten Monat ab 5. Zyklustag (gerechnet vom. 1. Tag der Periode) 1 Tablette Clomhexal ® 50mg - 5 Tage lang (5. bis 9. Zyklustag)
- Am etwa 10.-12. Zyklustag bitte Vorstellung in der Praxis mit Ultraschall zur Bestimmung der Follikelzahl (Mehrlingsrate unter Clomhexal ® erhöht)
- 1x 5000IE Pregnyl (HCG) am 14. ZT (Auslösen des Eispungs)
- 1 Tag später Geschlechtsverkehr (nach ca 30 Stunden)
- Bei Ausbleiben der zu erwartenden Regelblutung bitte Vorstellung in der Praxis mit Schwangerschaftstest
- Falls es nach dem ersten Monat zu einer Periodenblutung gekommen ist, keine Schwangerschaft eingetreten ist -> wie oben erwähnt jedoch 2 Tabletten Clomhexal ® (also 100mg pro Tag
- im dritten Monat dann wieder 2 Tabletten Clomhexal ® pro Tag
- Nach erfolgloser dreifacher frustraner Therapie mit Clomhexal ® wird die Vorstellung in der Praxis erbeten mit Besprechung des weiteren Procederes.
- Bitte beachten Sie, dass die Schwangerschaftsrate unter Clomhexal Therapie je nach Alter bei ca. 10% liegt.
- Bitte nehmen Sie bei Kinderwunsch täglich Folsäure und Jod (z.B. Folio forte oder Femibion 1) ein.